



## Atención preventiva: adolescentes, niños y recién nacidos

Todos los servicios se deben obtener de un proveedor de la red. Esta lista está sujeta a cambios según la Reforma de la Atención Médica (Health Care Reform).

### Examen de control del niño sano

Examen físico de control del niño sano y expediente médico, incluyendo talla, altura, peso, circunferencia de la cabeza, índice de masa corporal, presión, control del desarrollo, exámenes de la vista y evaluación de la conducta psicosocial. Los exámenes se hacen entre los 7 y 14 días de vida, al mes, a los 3, 6, 9, 12, 18, 24 y 30 meses de vida y anualmente hasta los 18 años.

### Pruebas de detección y evaluaciones en adolescentes

- Evaluaciones para detectar consumo de drogas y alcohol
- Evaluaciones de la conducta – de 11 a 17 años
- Medición de la presión – de 11 a 17 años
- Prueba de detección de displasia cervical – adolescentes de sexo femenino sexualmente activas
- Prueba de detección de clamidia – adolescentes sexualmente activos
- Evaluación para detectar depresión – de 11 a 17 años
- Prueba de detección de dislipidemia – niños con un riesgo más alto de tener trastornos lipídicos – de 11 a 17 años
- Quimiopprofilaxis con suplementos de fluoruro para niños que toman agua sin fluoruro
- Prueba de detección de gonorrea – adolescentes sexualmente activos
- Análisis de hematocritos o hemoglobina
- Medición de la altura, el peso y la masa corporal – de 11 a 17 años

- Prueba de detección del VIH – adolescentes sexualmente activos
- Análisis de los niveles de plomo – adolescentes en riesgo de exposición
- Análisis del nivel de lípidos/de colesterol – adolescentes de 17 y 18 años
- Asesoramiento sobre obesidad – a partir de los 6 años
- Evaluación de obesidad
- Prueba de Papanicolaou (cervical) – adolescentes de sexo femenino sexualmente activas
- Prueba de la vista de rutina
- Prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS), pruebas de detección y asesoramiento
- Prueba de la tuberculina – de 11 a 17 años
- Pruebas de deficiencia visual para detectar ambliopía, estrabismo y otros defectos de la visión – de 11 a 17 años

### Pruebas de detección y evaluaciones en niños

- Pruebas de detección del autismo – de 18 a 24 meses
- Evaluaciones de la conducta – de 1 a 10 años
- Medición de la presión – de 1 a 10 años
- Evaluación del desarrollo – menores de 3 años
- Prueba de detección de dislipidemia – niños con un riesgo más alto de tener trastornos lipídicos – de 1 a 10 años
- Quimiopprofilaxis con suplementos de fluoruro – niños en edad preescolar que toman agua de baja calidad
- Medición de la altura, el peso y la masa corporal – de 1 a 10 años
- Análisis de hematocritos o hemoglobina
- Análisis de los niveles de plomo – niños en riesgo de exposición

*Continúa atrás*



# Atención preventiva: adolescentes, niños y recién nacidos

- Asesoramiento sobre obesidad – a partir de los 6 años
- Evaluación de obesidad – a partir de los 6 años
- Evaluación de riesgos para la salud bucal – de 1 a 10 años
- Prueba de visión de rutina
- Prueba de la tuberculina – de 1 a 10 años
- Pruebas de tuberculosis
- Pruebas de deficiencia visual para detectar ambliopía, estrabismo y otros defectos de la visión – de 1 a 10 años

## Pruebas de detección y evaluaciones en recién nacidos

- Evaluaciones de la conducta – de 0 a 11 meses
- Medición de la presión – de 0 a 11 meses
- Medicación para prevenir la gonorrea – se aplica en los ojos de todos los recién nacidos
- Evaluación de la audición – de 0 a 11 meses
- Medición de la altura, el peso y la masa corporal – de 0 a 11 meses
- Análisis de hematocritos o hemoglobina
- Prueba de detección de hemoglobinopatías o enfermedad drepanocítica – recién nacidos
- Prueba de detección de hipotiroidismo – recién nacidos
- Suplementos para cubrir deficiencias de hierro en niños de 6 a 12 meses
- Análisis de los niveles de plomo – bebés en riesgo de exposición
- Evaluación de riesgos para la salud bucal – de 0 a 11 meses
- Pruebas de detección de fenilcetonuria (PKU) y otras enfermedades metabólicas – recién nacidos
- Prueba de la vista de rutina
- Prueba de la tuberculina – de 0 a 11 meses
- Pruebas de deficiencia visual para detectar ambliopía, estrabismo y otros defectos de la visión – de 0 a 11 meses

## Vacunas

- Difteria, tétanos, tos ferina (tos convulsa)
- Haemophilus Influenza Tipo B (HIB)
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Virus del papiloma humano (VPH) – hasta los 26 años
- Virus de la poliomielitis inactivado (IPV)
- Influenza (vacuna contra la gripe)
- Sarampión, paperas, rubéola (MMR)
- Antimeningocócica (meningitis)
- Antineumocócica (neumonía) – personas en riesgo
- Rotavirus
- Varicela